PARASSITOSI A SCUOLA

LA SCABBIA



COS'E'

La scabbia è una malattia infettiva dovuta a un'infestazione della pelle da parte di un tipo di acaro, il Sarcoptes Scabiei. Si prende principalmente per contatto diretto o con chi ne è affetto oppure con i tessuti (vestiti, indumenti, biancheria del letto) infestati dal parassita.




I SINTOMI

Prurito intenso che tende a peggiorare durante la notte.
Le aree corporee maggiormente interessate sono i polsi, gli spazi interdigitali delle mani e dei piedi, l'ombelico e il girovita, l'area sotto il seno, le ascelle e l'area genitale.



LA CURA

I trattamenti topici di prima linea sono la permetrina in crema al 5% e il benzoato di benzile (10-30%).
In genere, il medicinale deve essere applicato su tutto il corpo la sera e lasciato agire per almeno 8 ore. È consigliato ripetere il trattamento 2 volte, a distanza di una settimana l'uno dall'altro.



LIMITARE LA DIFFUSIONE

Lavare tutti i capi d'abbigliamento, ma anche la biancheria e gli asciugamani che potrebbero essere contaminati, a temperature alte (almeno 60 °C), oppure a secco. Gli oggetti contaminati che non possono essere lavati possono essere sigillati in un sacchetto di plastica ermeticamente chiuso per un paio di settimane.

RIVOLGERSI SEMPRE AL MEDICO IN CASO DI SOSPETTA SCABBIA

PARASSITOSI A SCUOLA

I PIDOCCHI



COS'E'

Il pidocchio del capo è un piccolissimo parassita che vive e si riproduce solo sulla testa dell'uomo dove depone le uova, chiamate lendini, causando la pediculosi del capo. Si riproducono molto velocemente, anche grazie al calore del cuoio capelluto.




I SINTOMI

La saliva dei pidocchi è irritante e per questo motivo il paziente infestato dai pidocchi lamenta intenso prurito, prevalentemente alla nuca e dietro le orecchie. Le uova sono facilmente osservabili a occhio nudo e, rispetto alla forfora, sono saldamente attaccate al capello.



LA CURA

Il trattamento per rimuovere i pidocchi è costituito da varie sostanze attive, reperibili in farmacia, che possono esser scelte in base all'età del bambino e alle diverse esigenze.
E' bene che tutta la famiglia effettui un controllo se un componente è colpito, valutando l'opportunità di effettuare tutti il trattamento.



LIMITARE LA DIFFUSIONE

Lavare tutti i capi d'abbigliamento, ma anche la biancheria e gli asciugamani che potrebbero essere contaminati, a temperature alte (almeno 60 °C), oppure a secco. Gli oggetti contaminati che non possono essere lavati possono essere sigillati in un sacchetto di plastica ermeticamente chiuso per un paio di settimane.

EFFETTUARE FREQUENTI CONTROLLI DEL CAPO DEI BAMBINI!!!